

ZÁSADY PRE HODNOTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU PODĽA TABUĽKY B

1. Výšku plnenia za rozsah trvalých následkov úrazu stanoví poisťovňa ako percentuálny podiel z poistnej sumy za trvalé následky úrazu dojednanej v poistnej zmluve, pričom percento plnenia pre príslušné telesné poškodenie určí podľa tabuľky B. Ak je uvedené v tabuľke B percentuálne rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.
2. Rozsah trvalých následkov úrazu sa hodnotí po ich ustálení (podľa medicínskych poznatkov spravidla rok po úraze) na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil. V prípade, že sa neustáli ani do troch rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tejto lehoty na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil.

TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazov

A HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY		
	úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu	
A01	do 2 cm ²	do 5 %
A02	od 2 do 10 cm ²	6-10 %
A03	nad 10 cm ²	11-25 %
A10	mozgové poruchy alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, verifikované neurologicky alebo psychiatricky	do 100 %
A11	poúrazová stresová porucha psychiatricky verifikovaná a trvale liečená (podmienkou je preukázanie utrpeného úrazu, ktorý spĺňa charakter úrazu v zmysle platných poistných podmienok pre posudzovanú poistnú zmluvu)	15 %
A12	trvalé následky po úraze hlavy bez preukázateľného poškodenia mozgu (bolesť, závrate, neurastenické príznaky, poúrazová bolesť hlavy atď.) - hodnotiteľné k 3.roku od úrazu, verifikované a trvale liečené psychiatrom al. neurológom	10 %
A20	traumatická porucha tvárového nervu verifikovaná neurologicky alebo EMG vyšetrením	do 15 %
A25	traumatické poškodenie trojklaného nervu , verifikované neurologicky, za každú vetvu (spolu sú 3 vetvy na každej strane)	5 %
	poškodenie tváre alebo krku (u žien vrátane dekoltu) a v prípade poruchy rastu vlasov aj na vlasatej časti hlavy sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti:	
A29	jazvy do 2 cm alebo do 1 cm ² celkovej plochy	0-4 %
A30	jazvy od 2 cm do 10 cm dĺžky alebo 1 cm ² do 5 cm ² celkovej plochy	5-10 %
A31	do 20 cm dĺžky alebo do 10 cm ² celkovej plochy	11-20 %
A32	nad 20 cm alebo nad 10 cm ² celkovej plochy	21-35 %
A33	poúrazové deformácie nosa bez funkčne významnej poruchy vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti	do 5 %
A40	moková fistula po poranení lebečnej spodiny	15 %
	poškodenie nosa alebo čuchu	
A50	strata hrotu nosa alebo mäkkých častí nosa	10 %
A51	strata celého nosa bez zúženia	15 %
A52	strata celého nosa so zúžením	25 %
A53	deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti po operačnej revízii hodnotená ORL lekárom	do 15 %
A60	chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	do 10 %
A61	chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín preukázateľne spôsobený úrazom, po operačnej revízii	do 10 %

A70	strata čuchu podľa rozsahu	do 10 %
A71	strata chuti podľa rozsahu	do 10 %
B OKO		
B01	následky očných poranení , ktoré majú za následok zníženie zrakovej ostrosti hodnotia sa podľa pomocnej tabuľky	
B02	za anatomickú stratu alebo atrofiu oka pripočítava sa k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti 5 %	
	strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie),	
B10	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť je horšia ako 6/12	do 10 %
B11	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou ani kontaktnou šošovkou	25 %
B12	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale je možná kontaktnou šošovkou	15 %
	strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie)	
B15	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť na lepšom oku je rovná alebo horšia ako 6/12	do 20 %
B16	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale len kontaktnou šošovkou alebo afakickými okuliarmi	25 %
B17	traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa	do 25 %
	diagnózy uvedené v bodoch B20-B21 sa hodnotia na základe perimetrického vyšetrenia	
B20	koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky	
B21	ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky	
	porušenie priechodnosti slzných ciest	
B25	na jednom oku	0,5-2 %
B26	na oboch očiach	3-6 %
	chybné postavenie rias operačne nekorigované	
B30	na jednom oku	0,5-3 %
B31	na oboch očiach	3-6 %
B35	rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa	do 5 %
B36	deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko	do 10 %
B40	traumatické poruchy akomodácie	do 10 %
	lagofthalmus poúrazový, operačne nekorigovateľný, vedúci k strate videnia	
B45	jednostranný	do 25 %
B46	obojsstranný	do 50 %
	ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu	
B50	jednostranná	do 25 %
B51	obojsstranná	do 50 %
C UCHO		
C01	strata jednej ušnice alebo jej časti	2,5-10 %
C02	strata oboch ušníc alebo ich častí	10-15 %
	deformita ušnice po chirurgickej revízii	
C04	jednostranná	0,5-5 %
C05	obojsstranná	5-15 %
	perforácia bubienka verifik. ORL lekárom	
C07	trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
C08	trvalá poúrazová perforácia bubienka so zjavnou sekundárnou infekciou spôsobená úrazom	8 %
	nahluchlosť potvrdená audiometriou	
C10	jednostranná ľahkého stupňa	2,5 %

C11	jednostranná stredného stupňa alebo tinnitus	3-5 %
C12	jednostranná ťažkého stupňa	6-12 %
C13	obojstranná ľahkého stupňa	2,5-5 %
C14	obojstranná stredného stupňa	6-20 %
C15	obojstranná ťažkého stupňa	30 %
strata sluchu potvrdená audiometriou		
C20	úplná jedného ucha	15 %
C21	úplná oboch uší	40 %
porucha labyrintu - odborne verifikovaná		
C30	jednostranná podľa stupňa	do 14 %
C31	obojstranná podľa stupňa	do 25 %
D ZUBY A POŠKODENIE CHRUPU		
strata		
D01	jedného zuba	5 %
D02	každého ďalšieho zuba - zvýšenie o 2 %	
D03	časti zuba so stratou vitality - za každý zub 1%	
D04	deformácia zubov I.-IV. vpravo a vľavo následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov	1-16 %
D05	strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0 %
poškodenie jazyka		
D10	stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa nehodnotia podľa bodov E05-E07	do 10 %
D11	strata jazyka alebo jeho časti	do 15 %
E KRK		
zúženie hrtana, priedušnice - odborne verifikované		
E01	ľahkého stupňa	10 %
E02	stredného stupňa	30 %
E03	ťažkého stupňa	65 %
E04	poškodenie návratného nervu úrazového pôvodu	15 %
strata - odborne verifikovaná		
E05	hlasu čiastočná	do 15 %
E06	hlasu úplná (afónia)	35 %
E07	strata schopnosti rozprávať v dôsledku poškodenia rečových ústrojov	40 %
E10	stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	45 %
E11	strata hrtana	80 %
F HRUDNÍK, PĽÚCA, SRDCE A PAŽERÁK		
obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc, hrudníkovej steny		
F01	ľahkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	5-10 %
F02	stredného stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	11-20 %
F03	ťažkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	21-30 %
iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu, verifikované spirometrickým vyšetrením		
F05	jednostranné	do 40 %
F06	obojstranné	do 80 %
F10	poruchy srdcové , overené ECHO, EKG vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie	do 80 %
F15	poruchy cievne , overené ECHO, SONO vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie	do 50 %
F16	jednostranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia jedného prsníka u žien do 45 rokov (vrátane)	30 %

F17	obojsstranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia oboch prsníkov u žien do 45 rokov (vrátane)	50 %
F18	jednostranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia jedného prsníka u žien nad 46 rokov (vrátane)	15 %
F19	obojsstranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy , úrazová amputácia oboch prsníkov u žien nad 46 rokov (vrátane)	30 %
F20	fistula pažeráka po chirurgických korekciách	do 50 %
F25	poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
F26	poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa po chirurgických korekciách	do 30 %
F27	poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa po chirurgických korekciách	do 50 %
F30	strata pažeráka s náhradou	do 80 %
G BRUCHO A TRÁVIACE ORGÁNY		
G01	poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	10 %
G02	porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy – verifikované gastroenterológom	do 80 %
G03	strata sleziny do 18 rokov	25 %
G04	strata sleziny nad 18 rokov	10 %
G05	poúrazová sterkorálna fistula chirurgicky nekorigovateľná, trvalá kolostómia následkom úrazu	60 %
G07	strata časti pečene (aj bez metabolickej odozvy)	15 %
	nedovieravosť análnych zvieračov	
G10	čiasťočná	20 %
G11	úplná, chirurgickou korekciou neodstrániteľná	50 %
G15	poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála	20-40 %
H MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY		
H01	strata obličky jednej	20 %
H02	strata obličky druhej alebo oboch	80 %
H05	poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie	do 40 %
H10	fistula močového mechúra alebo močovej rúry po chirurgických korekciách	do 40 %
H15	hydrokéla	0 %
H20	strata semenníka, strata vaječníka - jedného pri zachovaní funkcie druhého	5 %
H21	strata semenníka, strata vaječníka - oboch do 45 rokov vrátane	35 %
H22	strata semenníka, strata vaječníka - oboch od 46 do 60 rokov vrátane	20 %
H23	strata semenníka, strata vaječníka - oboch od 61 rokov	10 %
	strata mužského pohlavného údu	
H30	do 45 rokov vrátane	50 %
H31	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H32	od 61 rokov	15 %
	deformity alebo porucha funkcie mužského pohlavného údu	
H35	do 45 rokov vrátane	25 %
H36	od 46 do 60 rokov vrátane	15 %
H37	od 61 rokov	10 %
	poúrazové deformácie alebo funkčné postihnutie ženských pohlavných orgánov	
H40	do 45 rokov vrátane	50 %
H41	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H42	od 61 rokov	15 %
I CHRBTICA A MIECHA		
I01	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ľahkého stupňa	5 %
I02	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice stredného stupňa	10 %
I03	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ťažkého stupňa	20 %
	deformita hrudnej chrbtice – verifikovaná spirometrickým alebo rtg. vyšetrením	
I10	klinovitá deformita tela stavca do 10 st.	5 %

I11	klinovitá deformita tela stavca od 11 do 20 st.	10 %
I12	celkové zníženie výšky tela stavca	15 %
I13	deformita hrudnej chrbtice s verifikovanou spirometrickou úchylkou, alebo s neurologickou symptomatológiou a osovou úchylkou.	5-25 %
I15	obmedzenie hybnosti drierkovej chrbtice ľahkého stupňa	5 %
I16	obmedzenie hybnosti drierkovej chrbtice stredného stupňa	10 %
I17	obmedzenie hybnosti drierkovej chrbtice ťažkého stupňa	20 %
I20	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom ľahkého stupňa	do 20 %
I21	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom stredného stupňa	21-40 %
I22	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom ťažkého stupňa	41-100 %
I23	poúrazové poškodenie miechových plien a koreňov verifikované neurológom a MRI vyšetrením	20-50 %
J PANVA		
porušenie celistvosti panvového prstenca (s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín) verifikované chirurgicky, alebo neurologicky		
J01	u žien do 45 rokov vrátane	do 50 %
J02	u žien od 46 rokov a u mužov	do 35 %
K HORNÁ KONČATINA		
<i>Hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné!</i>		
úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im podobné)		
K01	vpravo	40 %
K02	vľavo	35 %
úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50-70 st., predpaženie 40-45 st., vnútorná rotácia 20 st.)		
K03	vpravo	30 %
K04	vľavo	25 %
obmedzenie rotačných pohybov ramenného kĺbu nad 50 % , bez obmedzenia iných druhov pohyblivosti		
K05	vpravo	6 %
K06	vľavo	5 %
obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.)		
K07	vpravo	6 %
K08	vľavo	5 %
obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.)		
K09	vpravo	10 %
K10	vľavo	8 %
obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.)		
K11	vpravo	16 %
K12	vľavo	14 %
vikľavosť (instabilita) ramena , verifikovaná ASK, alebo MR vyšetrením		
K13	ľahkého stupňa vpravo	6 %
K14	ľahkého stupňa vľavo	5 %
K15	stredného stupňa vpravo	8 %
K16	stredného stupňa vľavo	7 %
K17	ťažkého stupňa vpravo	12 %
K18	ťažkého stupňa vľavo	10 %
pakíľ ramennej kosti po opakovaných operáciach		
K19	vpravo	35 %

K20	vľavo	30 %	
chronický zápal kostnej drene (fistulácia) - len po otvorených zraneniach, alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu)			
K21	vpravo	30 %	
K22	vľavo	25 %	
K28	nenapravené sternoklavikulárne, alebo akromioklavikulárne vykĺbenie bez prípadnej poruchy funkcie		2 %
K29	poúrazové deformity ramennej kosti s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané - za každých 5 st. úchylky.		3 %
úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)			
K31	vpravo	30 %	
K32	vľavo	25 %	
úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkyh (ohnutie v uhle 90-95 st.)			
K33	vpravo	20 %	
K34	vľavo	16 %	
K35	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa vpravo		6 %
K36	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa vľavo		5 %
K37	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa vpravo		12 %
K38	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa vľavo		10 %
K39	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa vpravo		16 %
K40	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa vľavo		14 %
úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkyh (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení)			
K41	vpravo	18 %	
K42	vľavo	15 %	
úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)			
K43	vpravo	12 %	
K44	vľavo	10 %	
obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa			
K45	vpravo	6 %	
K46	vľavo	5 %	
obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia stredného stupňa			
K47	vpravo	10 %	
K48	vľavo	8 %	
obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa			
K49	vpravo	16 %	
K50	vľavo	14 %	
pakíb oboch kostí predlaktia po opakovaných operáciách.			
K51	vpravo	25 %	
K52	vľavo	20 %	
pakíb vretennej kosti po opakovaných operáciách			
K55	vpravo	15 %	
K56	vľavo	10 %	
pakíb laktovej kosti			
K59	vpravo	15 %	
K60	vľavo	10 %	

chronický zápal kostnej drene predlaktia (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu)		
K63	vpravo	23 %
K64	vľavo	18 %
kývavý lakt'ový kĺb (verifikované rtg) Hodnotí sa k tretiemu roku po úraze!		
K67	vpravo	11 %
K68	vľavo	8 %
L ZÁPÄSTIE A PRSTY Hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné!		
úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkyh (úplné ohnutie oboma smermi)		
L01	vpravo	25 %
L02	vľavo	20 %
úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (ohnutie ruky 20-40 st.)		
L03	vpravo	20 %
L04	vľavo	15 %
pakĺb člnkovitej kosti		
L05	vpravo	15 %
L06	vľavo	12 %
obmedzenie pohyblivosti zápästia		
L10	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L11	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L12	stredného stupňa vpravo	12 %
L13	stredného stupňa vľavo	10 %
L14	ťažkého stupňa vpravo	16 %
L15	ťažkého stupňa vľavo	14 %
vikľavosť (instabilita) zápästia , verifikovaná rtg.		
L20	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L21	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L22	stredného stupňa vpravo	8 %
L23	stredného stupňa vľavo	7 %
L24	ťažkého stupňa vpravo	12 %
L25	ťažkého stupňa vľavo	10 %
porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ťažkého stupňa		
L30	vpravo	15 %
L31	vľavo	12 %
porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti stredného stupňa		
L35	vpravo	12 %
L36	vľavo	8 %
porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ľahkého stupňa		
L40	vpravo	6 %
L41	vľavo	5 %
porucha úchop. funkcie ukazováka , do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm		
L45	vpravo	6 %
L46	vľavo	5 %
porucha úchopovej funkcie ukazováka , do úplného zovretia dlane chýba 3-4 cm		
L50	vpravo	5 %
L51	vľavo	4 %
porucha úchopovej funkcie ukazováka , do úplného zovretia dlane chýba 1-3 cm		
L55	vpravo	2 %
L56	vľavo	1,5 %
nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka		

L60	vpravo	2 %
L61	vľavo	1,5 %
nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie		
L62	vpravo	2,5 %
L63	vľavo	2 %
porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm		
L65	vpravo	3 %
L66	vľavo	2,5 %
porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba 3-4 cm		
L70	vpravo	2 %
L71	vľavo	1,5 %
porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba od 1 do 3 cm		
L72	vpravo	1,5 %
L73	vľavo	1 %
nemožnosť úplného vystretia jedného zo základných, alebo jedného z medzichľankových kĺbov prsta (za jeden kĺb na prste)		
L74	vpravo	1,5 %
L75	vľavo	1 %
pouřazové obehové a trofické poruchy		
L78	na jednej hornej končatine	do 6 %
L79	na oboch horných končatinách	do 12 %
traumatické poruchy nervov		
axilárneho nervu		
L80	vpravo	do 25 %
L81	vľavo	do 22 %
vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov		
L82	vpravo	do 35 %
L83	vľavo	do 30 %
kmeňa vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu		
L84	vpravo	do 25 %
L85	vľavo	do 22 %
laktového nervu s postihnutím inervovaných svalov		
L86	vpravo	do 35 %
L87	vľavo	do 30 %
distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov		
L88	vpravo	do 30 %
L89	vľavo	do 25 %
kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov		
L90	vpravo	do 30 %
L91	vľavo	do 25 %
distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva		
L92	vpravo	do 18 %
L93	vľavo	do 15 %
všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti)		
L94	vpravo	do 50 %
L95	vľavo	do 40 %
L96	traumatické poškodenie nervu len s postihnutím senzitívnej časti nervu, EMG diadnostikované	do 5 %
M DOLNÁ KONČATINA		
M01	pakľb stehnovej kosti	35 %
endoprotéza		
M02	do 30 rokov	35 %
M03	do 40 rokov	25 %

M04	nad 40 rokov	20 %
M05	chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu	30 %
skrátene jednej dolnej končatiny		
M07	od 1 do 2 cm	2 %
M08	od 2 do 4 cm	do 6 %
M09	od 4 do 6 cm	do 15 %
M10	nad 6 cm	do 25 %
M11	poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) od 5 stupňov	5- 40 %
úplná meravosť bedrového kĺbu		
M14	v nepriaznivom postavení (úplné pritiažnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	35 %
M15	v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	20 %
obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu		
M17	ľahkého stupňa	6 %
M18	stredného stupňa	12 %
M19	ťažkého stupňa	18 %
úplná meravosť kolena		
M20	v nepriaznivom postavení (ohnutie nad uhol 20 st.)	25 %
M21	v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad uhol 30 st.)	30 %
M22	v priaznivom postavení	20 %
endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu		
M23	do 30 rokov	30 %
M24	31-40 rokov	20 %
M25	nad 41 rokov	15 %
extirpácia jabĺčka		
M26	čiasťová	5 %
M27	úplná	8 %
obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu		
M28	ľahkého stupňa	6 %
M29	stredného stupňa	12 %
M30	ťažkého stupňa	18 %
kývavosť (instabilita) kolenného kĺbu Nutný popis testov stability s vyhodnotením stupňa instability vo všetkých vyšetrovaných smeroch (1.-3.st.)!		
M31	ľahkého stupňa	7 %
M32	stredného stupňa	14 %
M33	ťažkého stupňa	20 %
trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku alebo jeho časti		
M34	parciálna menisectómia	2 %
M35	subtotálna menisectómia	5 %
M36	totálna menisectómia	6 %
trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov alebo ich častí		
M37	parciálna menisectómia	5 %
M38	subtotálna menisectómia	8 %
M39	totálna menisectómia	12 %
M40	pakľb pišťaly alebo oboch kostí predkolenia	30 %
M41	chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu.	30 %

M42	poúrazové deformity predkolenia s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané - za každých 5 st. úchylky	5 %
úplná meravosť členkového kĺbu Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!		
M43	v nepriaznivom postavení	20 %
M44	v priaznivom postavení	15 %
obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu		
M45	ľahkého stupňa	5 %
M46	stredného stupňa	7 %
M47	ťažkého stupňa	13 %
M49	úplná strata pronácie alebo supinácie nohy	8 %
M50	obmedzenie pronácie alebo supinácie nohy	4 %
M51	kývavosť (instabilita) členkového kĺbu , verifikovaná rtg	8 %
M52	plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka alebo nohy	do 10 %
M54	chronický zápal kostnej drene v oblasti nohy len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu	15 %
úplná meravosť palca		
M55	medzičlánkového kĺbu palca nohy	1,5 %
M56	základného kĺbu palca nohy	2,5 %
obmedzenie pohyblivosti palca		
M58	medzičlánkového kĺbu palca nohy	1 %
M59	základného kĺbu palca nohy	2 %
M60	porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1 %
poúrazové obehové a trofické poruchy		
M61	na jednej dolnej končatine	do 10 %
M62	na oboch dolných končatinách	do 20 %
traumatické poruchy nervov dolnej končatiny		
M65	sedacieho nervu	do 40 %
M66	stehnového nervu	do 35 %
M67	zapchávajúceho nervu (obturatorius)	do 20 %
M68	kmeňa pišťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 35 %
M69	distálnej časti pišťalového nervu s postihnutím funkcie prstov	do 10 %
M70	kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 30 %
M71	hlbokej vetvy ihlicového nervu	do 20 %
M72	povrchovej vetvy ihlicového nervu	do 10 %
M73	traumatické poškodenie nervu len s postihnutím senzitívnej časti nervu, diagnostikované EMG vyšetrením	do 5 %
N AMPUTÁCIE - HORNÁ KONČATINA		
N01	strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže bez replantácie vpravo	60 %
N02	strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže bez replantácie vľavo	55 %
N05	strata predlaktia pri zachovanom lakt'ovom kĺbe bez replantácie vpravo	50 %
N06	strata predlaktia pri zachovanom lakt'ovom kĺbe bez replantácie vľavo	45 %
strata ruky v zápästí		
N09	bez replantácie vpravo	45 %
N10	bez replantácie vľavo	40 %
strata končatiny vo výške záprstných kostí		

N13	bez replantácie vpravo	40 %
N14	bez replantácie vľavo	35 %
strata palca so záprstnou kosťou		
N18	bez replantácie vpravo	22 %
N19	bez replantácie vľavo	18 %
strata oboch článkov palca		
N23	bez replantácie vpravo	20 %
N24	bez replantácie vľavo	17 %
strata koncového článku palca		
N27	bez replantácie vpravo	8 %
N28	bez replantácie vľavo	5 %
strata ukazováka so záprstnou kosťou		
N31	bez replantácie vpravo	12 %
N32	bez replantácie vľavo	10 %
strata troch článkov ukazováka		
N35	bez replantácie vpravo	10 %
N36	bez replantácie vľavo	9 %
strata dvoch článkov ukazováka		
N39	bez replantácie vpravo	6 %
N40	bez replantácie vľavo	5 %
strata koncového článku ukazováka		
N43	bez replantácie vpravo	3 %
N44	bez replantácie vľavo	2,5 %
strata tretieho alebo štvrtého prsta so záprstnou kosťou		
N47	bez replantácie vpravo	7 %
N48	bez replantácie vľavo	6 %
strata tretieho alebo štvrtého prsta		
N51	bez replantácie vpravo	5 %
N52	bez replantácie vľavo	3,5 %
strata dvoch článkov tretieho alebo štvrtého prsta		
N55	bez replantácie vpravo	4 %
N56	bez replantácie vľavo	3 %
strata koncového článku tretieho alebo štvrtého prsta		
N59	bez replantácie vpravo	3 %
N60	bez replantácie vľavo	1 %
strata malíčka so záprstnou kosťou		
N63	bez replantácie vpravo	5 %
N64	bez replantácie vľavo	4 %
strata troch článkov malíčka		
N67	bez replantácie vpravo	4 %
N68	bez replantácie vľavo	3 %
strata dvoch článkov malíčka		
N71	bez replantácie vpravo	3 %
N72	bez replantácie vľavo	2 %
strata koncového článku malíčka		
N75	bez replantácie vpravo	2 %
N76	bez replantácie vľavo	1 %
AMPUTÁCIE - DOLNÁ KONČATINA		
N79	strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe (exartikulácia bez replantácie)	50 %
N81	strata dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom bez replantácie	40 %
strata dolnej končatiny so zachovaním kolenného kĺbu		
N83	bez replantácie	35 %
strata nohy so zachovaním päty		
N85	bez replantácie	20 %

N87	strata všetkých prstov nohy a časti záprstných kostí nohy bez replantácie	15 %
N89	strata palca nohy a hlavičky jeho záprstnej kosti bez replantácie	10 %
N91	strata palca nohy alebo jeho časti bez replantácie	5 %
N93	strata druhého, tretieho alebo štvrtého prsta nohy a časti jeho záprstnej kosti, za každý prst bez replantácie	2 %
N95	strata druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho prsta nohy alebo jeho posledného článku, za každý prst bez replantácie	1 %
N97	strata malíčka so záprstnou kosťou na nohe bez replantácie	10 %
R	PLOŠNÉ JAZVY	
	rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie)	
R01	pod 0,25 % telesného povrchu (u dospelého človeka pod 43,25 cm ²)	0 %
R02	keloidná jazva od 3 cm ² do 0,25% povrchu tela	do 2 %
R03	od 0,25 % do 0,5% telesného povrchu (u dospelého človeka od 43,26 – 86,5 cm ²)	do 5 %
R04	od 0,5% do 15% povrchu tela (u dospelého človeka od 86,6 – 2 595 cm ²)	6 -30 %
R05	nad 15 % telesného povrchu (u dospelého človeka nad 2 596 cm ²)	31 - 50 %
R06	poúrazové poškodenie vyžadujúce si nepretržité a trvalé napojenie na dýchací prístroj (umelá pľúcna ventilácia)	40 %
R10	u ostatných diagnóz, neuvedených v tabuľke B, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno rozsah trvalých následkov porovnať	